



# INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ

— GUIDE OBSERVATEUR —  
2014

PROCOLE  
FICHES DE TERRAIN  
GUIDES D'IDENTIFICATION  
FICHES D'AIDE À L'OBSERVATION



---

Insectes et Ciel Étoilé est une enquête participative co-fondée par Noé Conservation, le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Association Française d'Astronomie. Elle fait partie du programme de sciences participatives du Muséum, Vigie-Nature.



**Muséum  
national  
d'Histoire  
naturelle**



**VIGIE**NATURE  
Un réseau de citoyens  
qui fait avancer la science

---

Insectes et Ciel Étoilé bénéficie du soutien de :



 **île de France**



**AUBRILAM**  
— ET L'ESPACE VIT —



## SOMMAIRE

**Pourquoi une enquête « Insectes et Ciel étoilé » ? .....**

**Les outils pour participer .....**

**Le protocole .....**

1. Insectes
2. Étoiles

**Les fiches de terrain .....**

1. Site d'observation
2. Insectes
3. Étoiles / Constellation du Lion
4. Étoiles / Constellation de la Vierge
5. Étoiles / Constellation du Cygne

**Les guides d'observation .....**

1. Insectes
2. Constellation du Lion
3. Constellation de la Vierge
4. Carte du ciel - Lion et Vierge
5. Constellation du Cygne
6. Carte du ciel - Cygne

**Les fiches d'aide .....**

1. Bon à savoir
2. Mémo identification
3. Mémo visuel
4. Débuter en astro
5. Le cycle lunaire
6. Glossaire
7. Schéma insecte

## POURQUOI UNE ENQUÊTE « INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ » ?

---

### La nuit, un monde fabuleux !

L'univers nocturne est un monde vivant, inépuisable de surprises et riche en biodiversité. On pourrait penser que la nature dort la nuit, mais c'est tout le contraire ! Les espèces nocturnes, tout comme les espèces diurnes, participent pleinement à l'équilibre des écosystèmes. De nombreux insectes nocturnes sont ainsi, entre autres, essentiels pour la pollinisation des plantes à fleurs. Saviez-vous par exemple qu'il existe en France moins de 300 espèces de papillons « de jour » contre environ 5000 espèces actives la nuit, soit 20 fois plus ?

### Un environnement nocturne menacé

#### Pollution lumineuse

Le ciel étoilé est de moins en moins visible au cœur des agglomérations. D'après le premier atlas de la pollution lumineuse, sont concernés :

- au niveau mondial, 19% des terres émergées et 62% de la population ;
- à l'échelle de la France, 99% du territoire et 100% de la population.

Les éclairages artificiels, qui répondent à des enjeux de sécurité ou d'esthétique pour les communautés humaines, représentent près de 40% de la facture d'électricité des communes. Et lorsqu'ils sont excessifs ou inadaptés, ils contribuent à la pollution lumineuse, qui augmente en moyenne de 6% par an !

#### Des réponses contrastées

La lumière et ses cycles journaliers ou saisonniers ont conditionné l'apparition, chez les organismes vivants, de systèmes visuels et de photorécepteurs, ainsi que d'horloges biologiques conduisant à une certaine représentation spatiale et temporelle de leur environnement. Modifier ces cycles naturels, par un ajout de lumière artificielle, altérerait donc leur perception innée du milieu naturel.

La lumière artificielle modifie notamment le sens de l'orientation de certaines espèces. La réponse à la lumière peut être attractive, comme chez certains insectes nocturnes et oiseaux migrateurs, ou répulsive, comme chez les mammifères



Gauche : Zone urbaine éclairée de nuit © Shutterstock / Media Union  
Droite : Sphinx du liseron, *Agrius convolvuli* © Biosphoto / Malcolm Schuyt / Still Pictures

nocturnes et notamment certaines espèces de chauves-souris. À ce propos, il est étonnant de constater que la Pipistrelle commune, espèce à vol rapide très caractéristique de nos villes, profite de la manne de nourriture que constituent les insectes agglutinés autour des lampadaires. À contrario, le Grand rhinolophe, qui peuple les combles des vieux édifices, est lucifuge, c'est-à-dire qu'il fuit systématiquement la lumière et évite tout déplacement croisant des continuités lumineuses. La lumière artificielle perturberait aussi la communication entre individus et notamment en période de reproduction. Ainsi, chez les amphibiens, les fortes illuminations peuvent inhiber les chants nuptiaux. De même, en présence d'éclairage artificiel, il arrive que les individus se montrent moins sélectifs quant au choix de leur partenaire et ce pour accélérer la vitesse d'accouplement et limiter le risque de prédation. Or, le succès d'une reproduction passe, entre autres, par la sélection dudit partenaire.

Il paraît donc aisé de conclure que la lumière artificielle a un impact sur la biodiversité. **Cependant, évaluer cet impact s'avère souvent délicat. Des messages contradictoires subsistent et beaucoup de questions demeurent en suspens lorsqu'on souhaite l'étudier à l'échelle d'un taxon ou même d'une espèce.**



## INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ : LES OBJECTIFS .....

L'enquête participative « Insectes et Ciel étoilé » est un projet initié par Noé Conservation, le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Association Française d'Astronomie. C'est le premier programme de sciences participatives liant astronomie et biodiversité au sein d'une même enquête.

L'enquête « Insectes et Ciel étoilé » a pour objectif d'évaluer l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité, en couplant l'observation des étoiles à celle des insectes nocturnes.

Le protocole standardisé comporte deux volets et permet ainsi une initiation simultanée aux pratiques de l'astronomie et de l'entomologie. Il ne nécessite ni matériel compliqué, ni compétences préalables dans aucun des deux domaines :

Insectes et Ciel Étoilé est ouvert à tous !

En 2013 était lancée la phase pilote de l'enquête « Insectes et Ciel étoilé ». Les premiers résultats suggèrent une augmentation de la diversité et de la quantité d'insectes avec l'augmentation de la qualité du ciel. C'est à dire que plus on observe d'étoiles, plus on observerait d'insectes et d'espèces différentes !

**Il faut maintenant confirmer ces résultats en s'appuyant sur un grand nombre d'observateurs !**

[ice.noeconservation.org](http://ice.noeconservation.org)  
Contact : [ice@noeconservation.org](mailto:ice@noeconservation.org)



# Je participe !



# INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ : LES OUTILS POUR PARTICIPER

AVANT L'ENQUÊTE POUR SE PRÉPARER, PUIS SUR LE TERRAIN .....



## Le protocole - p.xx

C'est la démarche à suivre pour faire vos observations. Il comporte deux parties, « [Insectes](#) » et « [Ciel étoilé](#) »



## Les fiches de terrain - p.xx

Ce sont les fiche à remplir lors de vos observations sur le terrain

[Site d'observation](#) : à remplir sur chaque nouveau site suivi (votre jardin, dans un champ...)

[Insectes](#) : à compléter à chaque session d'observation des insectes

[Étoiles](#) : à compléter à chaque session d'observation des étoiles

[Commentaires](#) : pour prendre des notes



## Les guides d'observation- p.xx

[Insectes](#) : des fiches détaillées pour identifier les insectes observés

[Étoiles](#) : des schémas et des cartes du ciel pour repérer les constellations du Lion, de la Vierge et du Cygne



## Les fiches d'aide - p.xx

[Bon à savoir](#) : comment identifier un insecte ?

[Mémo identification](#) : la liste de tous les insectes pour se familiariser à l'identification

[Mémo visuel](#) : une synthèse visuelle pour faciliter l'identification des insectes

[Débuter en astro](#) : quelques outils pour bien débuter en astronomie

[Le cycle lunaire](#) : un rappel sur les différentes phases de la lune

[Glossaire et schéma](#) : pour utiliser les bons termes !

APRÈS L'ENQUÊTE .....



## Le formulaire web

Pour saisir vos données. Cette étape est primordiale pour que les scientifiques puissent recevoir vos informations !

[lien bitly](#)



## Le forum Papillons des Jardins

Pour échanger et poser vos questions  
[papillonsetjardin.org](http://papillonsetjardin.org)



## LE PROTOCOLE

1. Insectes
2. Ciel Étoilé



| **Durée** : ~ 1h30

Le protocole de l'enquête comprend deux parties : insectes et étoiles. Ces deux parties peuvent être réalisées indépendamment. Néanmoins, nous vous recommandons de réaliser les deux parties du protocole. En effet, les données pourront être exploitées statistiquement uniquement si assez d'observations ont été saisies dans les deux parties du protocole. Vous pouvez réaliser vos observations la même nuit, ou lors de nuits différentes en fonction de vos disponibilités et des conditions d'observation.

## MATÉRIEL

- Un drap blanc (190x140cm)
- Une ampoule \*
- Une prise secteur ou un allume-cigare \* de voiture pour brancher l'ampoule
- Si besoin une rallonge dans le cas où le dispositif se fait dans le jardin (pour éloigner la source lumineuse de la maison)
- Les fiches d'identification des insectes
- La fiche de terrain pour noter vos observations d'insectes

## IMPORTANT

\* **Choix de l'ampoule** : Afin que les données d'observation soient comparables d'un observateur à un autre, l'ampoule utilisée doit être neuve au début de vos observations (si vous en réalisez plusieurs, il n'est pas utile d'en acheter une à chaque fois !) et choisie parmi les trois ampoules aux caractéristiques similaires proposées ci-dessous. D'un budget inférieur à 15€, elles se trouvent aisément dans le commerce :

Option 1 : Philips Tornado couleur Blanc chaud (110 W)

Option 2 : DIALL couleur Blanc chaud (102 W)

Option 3 : Philips couleur Lumière du Jour (103 W)

\* **Allume-cigare** : Dans le cas de l'utilisation d'un allume cigare, il convient de s'équiper d'un convertisseur pour alimenter l'ampoule en tension 220V. Les grandes surfaces de bricolage proposent différents modèles 12-220V. En voici deux exemples :

Option 1 : Convertisseur 12/230 V 150 W Watt&Co

Option 2 : Convertisseur 150W GENIUS Gpdz150

## CONDITIONS D'OBSERVATION

| **Dates d'observation** : de fin avril au 31 octobre. Les observations peuvent se faire tous les jours dans cette période.

**Le truc en plus** : Pour être dans des conditions optimales, vous pouvez privilégier - mais ce n'est pas obligatoire - la période d'observation de 10 jours autour de la nouvelle lune (phase de la Lune ou celle-ci est entre la terre et le soleil, elle n'est donc pas visible dans le ciel). En effet, une phase proche de la pleine lune pourrait concurrencer l'attractivité de la lampe mise en place pour attirer les insectes.

Pour plus de détails sur les phases lunaires, voir annexe en p.xx.



Périodes d'observation optimales en fonction de la date de la nouvelle lune :

29 avril : du 29 avril au 4 mai

28 mai : du 23 au 2 juin

27 juin : du 22 juin au 2 juillet

27 juillet : du 22 juillet au 1er août

25 août : du 20 août au 30 août

24 septembre : du 19 au 29 septembre

23 octobre : du 18 au 28 octobre

| **À partir de quelle heure observer ?** Les observations doivent se faire au coucher du soleil, qui varie en fonction de l'avancement dans l'année.

**Le truc en plus** : Les horaires ci-dessous correspondent à la fin du crépuscule dit « civil », c'est à dire lorsque le soleil est passé entre 0 et 6° sous l'horizon. C'est le début de la nuit.

**Date d'observation**



**Horaire d'observation**

aux alentours du **15 mai**

aux alentours du **15 juin**

aux alentours du **15 juillet**

aux alentours du **15 août**

aux alentours du **15 septembre**

aux alentours du **15 octobre**

après 22h

après 22h40

après 22h30

après 21h40

après 20h30

après 19h30

Si vous réalisez vos observations entre ces dates, vous pouvez prendre une moyenne (par exemple pour une observation le 30 août, vous pouvez considérer que vos observations du ciel peuvent commencer après 21h environ). Vous pouvez également consulter les horaires précis du crépuscule civil sur : <http://www.ephemeride.com/calendrier/solaire/19/?act=CHGTYPE&type=2> Sélectionnez « crépuscule civil » dans la colonne de gauche et notez l'heure de coucher du soleil à la date qui vous intéresse.



| **Fréquence d'observation** : aussi souvent que vous le souhaitez, sur le même site d'observation (par exemple votre jardin) et/ou sur des sites différents

| **Vent** : faible ou absent

| **Éclairage** : si possible, être à plus de 10m des sources d'éclairage public

## MÉTHODE

### | Préparation du dispositif :

1. Étendre le drap blanc sur le lieu choisi pour les observations.
2. Placer l'ampoule à environ 20 cm de hauteur, sur un pied de lampe (sans abat-jour !) ou suspendue à un fil, au-dessus du drap blanc posé sur le sol.

### | Observations :

3. Aux heures indiquées, allumer le dispositif préparé préalablement.
4. Le laisser en place **pendant 1h** afin d'attirer les insectes. Il convient d'éviter tout autre éclairage du jardin et de s'éloigner, dans la mesure du possible, des fenêtres éclairées de la maison.

*Que faire pendant cette heure ? Vous pouvez profiter de ce*



Deux exemples de dispositifs pour installer la lampe © M.Evanno

*temps pour observer les différents insectes qui viennent fréquenter le drap et apprendre à les identifier. Vous pourrez ainsi plus aisément les compter lors du comptage (étape 5). Vous pouvez également repérer les constellations, en veillant à vous éloigner suffisamment de toute source lumineuse et à laisser le temps à vos yeux de s'habituer à l'obscurité (voir protocole étoiles). Vous pouvez aussi aller boire un thé ou regarder une série.*

5. Au bout d'une heure, revenir près du dispositif pour compter et identifier les insectes présents sur le drap à l'aide des fiches d'identification de ce guide. Cette phase ne doit pas durer plus de quelques minutes : il s'agit de noter les insectes présents sur le drap au bout d'une heure d'éclairage, sans se soucier de ceux qui pourraient arriver ensuite, ni ceux qui n'ont fait que passer.

**Le truc en plus** : Vous pouvez cependant noter dans la case « Insectes remarquables » les insectes que vous aurez pu identifier lors de l'heure d'éclairage, mais qui seraient partis au moment du comptage.

6. Éteindre le dispositif (attention à laisser refroidir la lampe avant de la manipuler).
7. Saisir vos observations en ligne.

## JE SAISIS MES OBSERVATIONS !

N'oubliez pas de saisir vos observations sur <http://goo.gl/SsZGzk> !

Cette étape est essentielle pour que les données soient transmises aux scientifiques puis analysées.



| **Durée** : moins de 30 min

Le protocole de l'enquête comprend deux parties : insectes et étoiles. Ces deux parties peuvent être réalisées indépendamment. Néanmoins, nous vous recommandons de réaliser les deux parties du protocole. En effet, les données pourront être exploitées statistiquement uniquement si assez d'observations ont été saisies dans les deux parties du protocole. Vous pouvez réaliser vos observations la même nuit, ou lors de nuits différentes en fonction de vos disponibilités et des conditions d'observation.

## MATÉRIEL

- Une lampe (frontale ou de poche) de lumière rouge pour pouvoir noter vos observations \*.
- La fiche d'identification des étoiles des constellations du Cygne, du Lion ou de la Vierge
- La fiche de terrain coorespondante pour noter vos observations

## IMPORTANT

\* **Pourquoi utiliser une lumière rouge ?** Pour observer les étoiles, il est indispensable de rester dans l'obscurité (au moins 20 minutes) afin d'adapter vos yeux à la vision nocturne. Hors, pour noter les étoiles visibles dans le ciel sur votre fiche de terrain, vous aurez besoin de lumière. L'utilisation d'une lumière rouge permet mieux conserver votre « vision nocturne » qu'une lumière blanche éblouissante ! Vous pouvez trouver dans le commerce des lampe frontales avec un mode lumière rouge, ou bien la fabriquer vous-même. Il suffit pour cela de fixer un ruban adhésif rouge, type ruban électricien, sur une lampe standard !

## CONDITIONS D'OBSERVATION

| **Dates d'observation** : de fin avril au 31 octobre. Les observations peuvent se faire tous les jours dans cette période.

**Le truc en plus** : Pour être dans des conditions optimales, vous pouvez privilégier - mais ce n'est pas obligatoire - la période d'observation de 10 jours autour de la nouvelle lune (phase de la Lune ou celle-ci est entre la terre et le soleil, elle n'est donc pas visible dans le ciel). En effet, une phase proche de la pleine lune pourrait concurrencer l'attractivité de la lampe mise en place pour attirer les insectes.

Pour plus de détails sur les phases lunaires, voir annexe en p.xx.



Périodes d'observation optimales en fonction de la date de la nouvelle lune :

29 avril : du 29 avril au 4 mai  
 28 mai : du 23 au 2 juin  
 27 juin : du 22 juin au 2 juillet  
 27 juillet : du 22 juillet au 1er août  
 25 août : du 20 août au 30 août  
 24 septembre : du 19 au 29 septembre  
 23 octobre : du 18 au 28 octobre

### | Quelles constellations observer ?

Mai : Constellation du Lion  
 Juin : Constellation du Lion ou de la Vierge  
 Le reste du temps : Constellation du cygne

| **À partir de quelle heure observer ?** L'observation du ciel doit se faire à la fin de la partie « insectes » du protocole en laissant assez de temps à vos yeux pour s'habituer à l'obscurité (environ 20 minutes dans le noir).

## IMPORTANT

**Date d'observation**

aux alentours du **15 mai**  
 aux alentours du **15 juin**  
 aux alentours du **15 juillet**  
 aux alentours du **15 août**  
 aux alentours du **15 septembre**  
 aux alentours du **15 octobre**



**Horaire d'observation**

après 23h50  
 après 00h30  
 après 00h20  
 après 23h20  
 après 22h10  
 après 21h10



### | Fréquence d'observation

Aussi souvent que vous le souhaitez, sur le(s) site(s) où est mené le protocole insectes.

### | Nébulosité


Nulle, ciel dégagé.

### | Visibilité

Un site d'observation avec un minimum d'éclairage direct ou éblouissant et l'accès à une zone de ciel permettant d'observer à 45° de part et d'autre du zénith (voir le schéma ci-contre).

### | Éclairage :

Être à plus de 10 mètres des sources d'éclairage public.





Champ de visibilité pour l'observation des étoiles © M.Evanno

## MÉTHODE

### | Observations :

1. Repérer la constellation du Cygne, du Lion ou de la Vierge en fonction de la date d'observation (se repérer grâce aux cartes des constellations sur les fiches d'identification). La Constellation du Cygne est située près du zénith, en bordure de voie lactée. Celles du Lion et de la Vierge sont quant à elles à proximité de la Grande Ourse (plus d'informations sur la carte du ciel en p.xx) Des applications gratuites sur Smartphone telles que Stellarium ou Google Sky peuvent également vous aider à repérer les constellations.
2. Se mettre à l'abri de toute source importante de lumière, pendant une durée de 20 minutes. Cette durée est le temps d'adaptation de votre œil à la nuit et donc d'optimisation de votre acuité visuelle.
3. Reporter sur la fiche terrain les étoiles de la constellation que vous avez pu observer à l'oeil nu.



Constellation du Lion, du Cygne et de la Vierge © AFA | M.Evanno

## JE SAISIS MES OBSERVATIONS !

N'oubliez pas de saisir vos observations sur <http://goo.gl/SsZGzk> !

Cette étape est essentielle pour que les données soient transmises aux scientifiques puis analysées.



## LES FICHES DE TERRAIN

1. Site d'observation
2. Insectes
3. Étoiles / Constellation du Lion
4. Étoiles / Constellation de la Vierge
5. Étoiles / Constellation du Cygne
6. Commentaires



# 1. Fiche de terrain • Site d'observation



Les champs marqués d'une \* sont obligatoires

Merci de saisir vos données en ligne pour qu'elles puissent être analysées par les scientifiques du Muséum ! <http://goo.gl/SzZGzk>

## 1. OBSERVATEUR

Prénom \*

Nom \*

Adresse mail

Si vous souhaitez être tenu(e) informé(e) des actualités et des résultats de l'enquête

## 2. LIEU D'OBSERVATION

### Localisation

Nom du lieu d'observation

Commune

Lieu-dit

Latitude

### Mon site d'observation se trouve dans

- Un jardin urbain ou péri-urbain  
 Un jardin en milieu rural  
 Hors jardin

Si hors jardin, précisez :

### Éclairage

#### Le lieu est-il à proximité d'un éclairage ?

Ceci concerne les éclairages à moins d'1km du lieu d'observation : lampadaires, enseignes, monuments, maisons...

- Oui  
 Non

Si « Oui », précisez :

#### Distance à l'éclairage le plus proche

- 10-50 m  
 50-100 m  
 > 100 m

#### Forme de l'éclairage

- Lampadaire boule  
 Lampadaire à éclairage orienté à l'horizontale et vers le sol  
 Lampadaire à éclairage orienté uniquement vers le sol  
 Autre type d'éclairage : enseignes, monuments, maisons...

#### Couleur de l'éclairage

- Blanc  
 Jaune-orangé  
 Autre

Si « autre », précisez :

### Environnement

Indiquer les différents milieux observés à proximité du lieu d'observation. Il peut y avoir un ou plusieurs milieux à côté du lieu d'observation. Le Milieu 1 est le milieu le plus représenté.

	Milieu 1	Milieu 2	Milieu 3
Pelouse rase			
Pelouse haute / à gestion différenciée			
Boisement avec essences résineuses			
Boisement avec essences caduques			
Boisement mixte			
Champs			
Prairie			
Friche			
Autres zones agricoles (vignes, vergers, maraîchage...)			
Cours d'eau			
Mare, ou étang ou autre zone humide			
Zone bâtie			
Parcs et jardins (publics)			



## 2. Fiche de terrain • Insectes



Insectes &  
Ciel étoilé

Les champs marqués d'une \* sont obligatoires

### 1. CONDITIONS D'OBSERVATION

Date \*

Température (approximative-fourchette) \*

Heure de début d'observation \*

Force du vent \* Ampoule utilisée \*

Heure de fin d'observation \*

Nul

Philips Tornado couleur Blanc chaud (110 W)

Faible

DIALL couleur Blanc chaud (102 W)

Modéré

Philips couleur Lumière du Jour (103 W)

Fort

### 2. INSECTES OBSERVÉS

Insectes identifiés sur le drap	1 individu	Entre 2 et 5	Entre 6 et 10	Plus de 10
Insectes « remarquables »	1 individu	Entre 2 et 5	Entre 6 et 10	Plus de 10
<i>Ils ne sont pas posés sur le drap lors du comptage, mais vous avez pu les observer pendant l'heure qui précèdeait. Vous pouvez les noter ici.</i>				

Merci de saisir vos données en ligne pour qu'elles puissent être analysées par les scientifiques du Muséum ! <http://goo.gl/Ss7Gzk>



### 3. Fiche de terrain • Étoiles / Constellation du Lion

Les champs marqués d'une \* sont obligatoires

#### 1. CONDITIONS D'OBSERVATION

Date \*   
(Mai/Juin)

Heure de début d'observation \*

Heure de fin d'observation \*


Température (approximative-fourchette) \*

Force du vent \*  Nul  Faible  Modéré  Fort

Avez-vous réalisé le même soir le protocole insectes à l'aide du piège lumineux ? \*  Oui  Non

#### 2. ÉTOILES OBSERVÉES

Cocher ici les étoiles de la constellation du Lion que vous avez pu observer à l'œil nu



Constellation du Lion © AFA | M.Evanno

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<input type="checkbox"/>															

Merci de saisir vos données en ligne pour qu'elles puissent être analysées par les scientifiques du Muséum ! <http://goo.gl/SsZGzk>



# 4. Fiche de terrain • Étoiles / Constellation de la Vierge

Les champs marqués d'une \* sont obligatoires

## 1. CONDITIONS D'OBSERVATION

Date \* (Jun)

Température (approximative-fourchette) \*

Heure de début d'observation \*


Force du vent \* **Avez-vous réalisé le même soir le protocole insectes à l'aide du piège lumineux ? \***

Heure de fin d'observation \*

- Nul
- Faible
- Modéré
- Fort
- Oui
- Non

## 2. ÉTOILES OBSERVÉES

Cocher ici les étoiles de la constellation de la Vierge que vous avez pu observer à l'œil nu



Constellation de la Vierge © AFA | M.Evanno

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<input type="checkbox"/>														

Merci de saisir vos données en ligne pour qu'elles puissent être analysées par les scientifiques du Muséum : <http://goo.gl/Ss7Gzk>



# 5. Fiche de terrain • Étoiles / Constellation du Cygne

Les champs marqués d'une \* sont obligatoires

## 1. CONDITIONS D'OBSERVATION

Date \*   
De juillet à octobre

Température (approximative-fourchette) \*

Heure de début d'observation \*

Force du vent \*  Nul  Faible  Modéré  Fort


Heure de fin d'observation \*

Avez-vous réalisé le même soir le protocole insectes à l'aide du piège lumineux ? \*  Oui  Non

Merci de saisir vos données en ligne pour qu'elles puissent être analysées par les scientifiques du Muséum : <http://goo.gl/SsZGzk>

## 2. ÉTOILES OBSERVÉES

Cocher ici les étoiles de la constellation du Cygne que vous avez pu observer à l'œil nu



Constellation du Cygne © AFA | M.Evanno

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<input type="checkbox"/>														





## LES GUIDES D'OBSERVATION

1. Insectes
2. Constellation du Lion
3. Constellation de la Vierge
4. Carte du ciel - Lion et Vierge
5. Constellation du Cygne
6. Carte du ciel - Cygne



## Comment utiliser ce guide d'identification ?

Ce guide vous présente les groupes d'insectes que vous serez susceptibles de compter sur le drap lors du protocole «Insectes et Ciel étoilé». Les caractères distinctifs, la taille, une silhouette et/ou une photo (pour donner un exemple du type d'insectes rencontrés dans le groupe) ainsi qu'un petit paragraphe descriptif vous permettront d'identifier les groupes d'insectes. Certaines espèces sont également présentées, elles sont signalées par une flèche et un cadre violet, un peu en retrait du groupe auquel appartient l'espèce. Les dates d'observation sont précisées. Tous ces insectes sont présentés de manière synthétique dans la « Liste | Insectes » de ce guide. Vous pourrez ainsi aisément reporter les insectes observés sur la « Fiche terrain | Insectes ».

## ÉPHÉMÉROPTÈRES

### Ephémères (Éphéméroptères)



#### Caractères distinctifs


- Présence de 2 ou 3 longues cerques<sup>3</sup>
- Silhouette arquée
- Arrive en virevoltant maladroitement autour de la lampe

Taille : 3 à 40 mm (sans les cerques)

Parmi la diversité des insectes actuels, les éphémères présentent certains caractères typiques de fossiles âgés de plus de 300 millions d'années. Entre autres, leurs ailes ne peuvent se replier le long du corps comme chez la plupart des autres insectes. Fait étonnant : les adultes vivent à peine quelques heures, tout juste le temps de se reproduire pour assurer la pérennité de l'espèce, d'ailleurs à l'origine de leur nom d' « éphémères ». Par contre, les larves sont quant à elles aquatiques et vivent jusqu'à trois ans en eau douce. Selon votre proximité avec des points d'eau, vous verrez des adultes voler aux premières heures de la nuit, en solitaire ou formant un essaim autour de la lampe. Ces insectes semblent particulièrement impactés par les phénomènes de pollution lumineuse à proximité des points d'eau.

## DERMAPTÈRES

### Perce-oreilles (Dermaptères)



#### Caractères distinctifs

- Sortes de « pinces » (ce sont en fait des cerques<sup>3</sup>) à l'extrémité postérieure du corps
- Corps aplati et allongé, de couleur sombre
- Petite paire d'élytres

Taille : 1 à 2,5 cm

Les perce-oreilles chassent de nuit et sont de grands consommateurs d'autres insectes, ce qui en font souvent les alliés du jardinier. Les grandes ailes postérieures sont repliées sous les élytres<sup>4</sup>. Les cerques<sup>3</sup> en forme de pince sont des armes défensives mais n'ont absolument aucun effet sur les prédateurs les plus imposants (ne saisissez cependant pas les perce-oreilles, pour éviter de leur faire du mal !). Les cerques des mâles sont plus incurvées que chez les femelles. D'ailleurs, le nom de ces insectes viendrait du fait que ces cerques ressembleraient aux pinces jadis utilisées par les bijoutiers pour percer les oreilles des braves gens. Fable ou légende, qui sait?



## ORTHOPTÈRES


Courtilières (*Gryllotalpidae*)

Impressionnants insectes, les courtilières ont une morphologie particulièrement adaptée à leur mode de vie souterrain. Elles sont munies de pattes antérieures fouisseuses et d'un thorax<sup>2</sup> épaissi leur permettant de creuser les sols meubles des jardins, pépinières et prairies. Malgré leur aspect imposant, ces insectes sont très discrets car surtout actifs de nuit et ont conservé leur aptitude au vol. Ces « taupe-grillons » se nourrissent de racines, tubercules et vers de terre.

## Caractères distinctifs

- Pattes avant fouisseuses rappelant celles d'une taupe
- Aspect de gros grillon rampant
- Tête rappelant celle du homard

Taille : 3 à 6 cm

Grillons (*Gryllidae*)

## Caractères distinctifs

- Fémurs des pattes postérieures bien développés, à l'aspect « musclé »
- Deux cerques<sup>3</sup> à l'extrémité de l'abdomen<sup>1</sup>
- Couleur générale sombre, brune ou noire

Taille : 1 à 3 cm

Qui ne connaît pas le chant des grillons ? Chez ces insectes, seuls les mâles strident pour attirer les femelles. Ce sont les virtuoses au chant le plus puissant qui auront le plus de chances de trouver une femelle. Généralement les grillons s'activent lors de belles journées ensoleillées, et ce jusqu'au soir si les températures restent clémentes. Les stridulations sont émises par le frottement entre elles des élytres<sup>4</sup> sur lesquelles se trouvent un « archet » et un « grattoir ». Les femelles sont munies, en plus des cerques<sup>3</sup>, d'un long appendice en forme de pointe, au bout de l'abdomen, pour la ponte et l'enfouissement des œufs (ovis-capte<sup>8</sup>).

## Le grillon champêtre

(*Gryllus campestris*)



## Caractères distinctifs

- corps sombre, de couleur noire
- présence d'une bande jaunâtre, voire beige à la base des ailes

Se rencontre souvent lors des journées chaudes dans des habitats dégagés tels que les landes et les prairies sèches. Tant que la température ne passe pas en dessous de 12°C, on peut entendre les mâles striduler jusqu'à la nuit tombée. Il sera attiré par la lumière de votre lampe s'il se repose à proximité. La légende raconte qu'en trouver dans une maison porte alors bonheur à la demeure toute entière.

--

Espèces semblables : le grillon provençal (*Gryllus bimaculatus*) ; caractères discriminants : la base de chaque élytre<sup>4</sup> est jaunâtre / beige mais les deux tâches ne se rejoignent pas pour créer une bande unie

Taille : 1 à 3 cm

Dates d'observation : de mai à octobre, phase de reproduction jusqu'en juillet



## Criquets (*Caelifera*)



### Caractères distinctifs


- Antennes<sup>2</sup> plus courtes que le corps
- Pattes arrière sauteuses

Taille : 1,5 à 7 cm

Les criquets sont bien connus pour les ravages saisonniers qu'ils occasionnent aux cultures en Afrique. Ils sont même accusés, dans la Bible, d'avoir été l'un des dix fléaux de l'Égypte antique. Lorsque les conditions environnementales sont réunies, les criquets grégaires se rassemblent effectivement en nuées qui, à la dérive des masses d'air, dévorent toute végétation sur leur passage. Ceci dit, la plupart des criquets de nos régions sont plutôt solitaires, de petite taille et ornés de tenues camouflées les faisant passer inaperçus parmi la végétation. Ils strident en frottant leurs pattes sur leurs élytres<sup>4</sup>, et leur chant constitue souvent l'ambiance sonore des prairies lors des journées ensoleillées.

## Sauterelles et éphippigères

(*Tettigonioidea*)



Chez les sauterelles, les femelles sont tout à fait capables de striduler avec leurs ailes pour répondre aux mâles dotés d'un chant un peu plus puissant. Grâce à leurs puissantes mandibules<sup>7</sup>, les sauterelles ont un régime omnivore constitué aussi bien de brindilles, de fruits et de feuilles que de petits insectes. Et si vos doigts passent à proximité de ces mandibules, attention à ne pas vous faire pincer ! L'oviscapte<sup>8</sup> en forme de sabre des femelles, pointe située derrière l'insecte, est souvent très imposant mais totalement inoffensif.

### Caractères distinctifs

- Antennes<sup>2</sup> plus longues que le corps
- Pattes arrière sauteuses

Taille : 3 à 4 cm (6 cm ailes comprises)

## Le conocéphale gracieux

(*Ruspolia nitidula*)



Grande sauterelle aux mœurs nocturnes, les mâles strident la nuit pour attirer les femelles. Cette espèce est omnivore et se contente aussi bien de petits insectes que des parties tendres de plantes. Autrefois inféodée aux régions méridionales, on la trouve à présent dans toute la France, dans tous types d'habitats (pelouses, prairies, friches, haies, accotements, etc.).

### Caractères distinctifs

- taille imposante
- vert clair ou brun / beige
- bout de la tête, en forme de cône, avec le front pointé en avant de manière très prononcée

Taille : longueur du corps 2 à 3 cm

Dates d'observation : adultes de juillet à octobre



## Grande sauterelle verte

(*Tettigonia viridissima*)



Ces sauterelles sont notables pour leur grande taille, certaines dépassant même les 10 cm d'envergure en vol. Essentiellement arboricole, aussi bien active de jour comme de nuit, elle chasse d'autres insectes qu'elle attrape d'un bond et dévore à l'aide de ses pattes préhensives et de puissantes mandibules<sup>7</sup>.

--

Espèces semblables : la sauterelle chanteuse (*Tettigonia cantans*) ; caractères discriminants : ailes pas plus longues que le corps

### Caractères distinctifs

- grande sauterelle (la plus grande de France)
- face plus aplatie que celle des conocéphales
- très longues ailes (deux fois plus longues que le corps à l'état adulte)


Taille : longueur du corps 3 à 4 cm

Dates d'observation : adultes de juillet à octobre

## HÉMIPTÈRES

### Punaises

(*Pentatomomorpha* et *Cimicomorpha*)



### Caractères distinctifs

- bien souvent, forme globale en écusson
- présence d'un rostre<sup>10</sup> replié sous le corps
- ailes antérieures à moitié rigidifiées (partie supérieure durcie par rapport à la partie inférieure souple)
- arrive sur le drap en marchant ou en volant

Les punaises disposent toutes d'un appareil buccal de type « piqueur-suceur », appelé rostre<sup>10</sup>, qui leur permet d'atteindre la sève et le nectar des plantes, le sang des vertébrés ou l'hémolymphe (le « sang ») des insectes dont elles se nourrissent. Fait bien connu, certaines d'entre elles éjectent une substance malodorante à la désagréable odeur d'œuf pourri. Cela n'est qu'un mécanisme de dissuasion, très efficace, pour repousser d'éventuels prédateurs en cas d'agression. Tout comme chez les orthoptères, les jeunes punaises sont reconnaissables à leurs ailes non pleinement développées, aux couleurs parfois bien différentes de celles des adultes.

Taille : 5 à 15 mm

### Notonectes et corixes

(*Nepomorpha*)



### Caractères distinctifs

- Forme ovale du corps (hydrodynamique)
- Arrive sur le drap en « ramant »
- Longues pattes postérieures rameuses, non fonctionnelles pour le déplacement terrestre

Groupe de punaises essentiellement aquatiques ressemblant aussi bien les notonectes, surnommés « abeilles d'eau » du fait de leur piqûre douloureuse, que les corixes, appelées « cigales d'eau » de par la puissance de leurs stridulations. La puissance des stridulations de quelques corixes irait même jusqu'à dépasser les 100 décibels, autant dire aussi fort que le barrissement d'un éléphant ! Bien qu'aquatiques, ces insectes n'en sont pas moins concernés par les problèmes de pollution lumineuse dans la mesure où les faisceaux de lumière artificielle les attirent hors de l'eau jusqu'à l'épuisement.

Taille : 1,5 cm



## Cigales et Cicadelles (*Cicadomorpha*)



Les cigales font partie des insectes dont le cycle de développement est très long par rapport à la durée de vie des adultes. Pour produire leur chant, elles disposent d'organes appelés cymbales qui actionnent une membrane et dont les percussions sont amplifiées par un caisson de résonance. Elles ne « strident » donc pas comme les grillons, on dit plutôt qu'elles « cymbalisent », devenant ainsi de véritables emblèmes sonores des régions méridionales. Les cicadelles apparentées aux cigales ont une morphologie similaire à ces dernières, bien que légèrement plus aplaties et aux ailes souvent vivement colorées. Ces dernières sont relativement méconnues, une espèce nouvelle pour la science ayant été décrite en Île-de-France tout juste en 2008.

Taille : 1,5 à 3 cm pour les cigales,  
3 à 13 mm pour les cicadelles

### Caractères distinctifs

- ailes en toit au repos
- petites antennes, voir absence d'antennes visibles
- yeux globuleux de part et d'autre de la tête
- deux paires d'ailes, transparentes chez les cigales, colorées chez les cicadelles
- déplacement par petits sauts



## Le grand diable (*Ledra aurita*)



### Caractères distinctifs

- présence de deux « cornes » sur le thorax
- tête aplatie
- robe camouflée de couleur grisâtre

Avec une partie de son thorax hypertrophié, le grand diable présente souvent de curieuses structures morphologiques servant généralement au camouflage sur les plantes qu'il affectionne. D'où le nom donné à cette espèce, en référence à ses deux « cornes » caractéristiques. Le « grand diable » passe généralement inaperçu dans son milieu naturel, mais ce ne sera pas le cas s'il vient, attiré par la lumière, en plein sur votre drap.

Taille : 1,5 cm

Dates d'observation : de mai à septembre



## COLÉOPTÈRES

Scarabées (*Scarabaeoidea*)

Les scarabées adultes ont une épaisse cuticule (« carapace ») constituée, comme chez tous les insectes, d'un polymère naturel : la chitine, matériau assurant la rigidité de leur corps tout en maintenant une élasticité suffisante et nécessaire au niveau des articulations de leurs appendices. La résistance de ce matériau et l'épaisseur de cette carapace font des scarabées de véritables cuirassés. C'est généralement leur ultime défense face aux prédateurs qu'ils affrontent, certains se résignant alors à partir en quête de proies moins coriaces.

**Caractères distinctifs**

- 1 paire d'élytres<sup>4</sup> dures recouvrant les ailes postérieures et l'abdomen<sup>1</sup>
- petit triangle bien visible à la base des élytres<sup>4</sup> (scutellum<sup>11</sup>)
- pattes épineuses, démarche pataude

Taille : 1 à 4 cm

▶ **Lucane cerf-volant** (*Lucanus cervus*)**Caractères distinctifs**

- présence chez le mâle de mandibules hypertrophiées
- thorax bombé
- base des élytres rectiligne

Taille : 3 à 8 cm

Dates d'observation : mai à septembre, les jeunes adultes hibernent

Il existe chez cette espèce un dimorphisme sexuel très prononcé. Les mâles ont des mandibules fortement hypertrophiées, à l'origine du nom de lucane « cerf-volant » ; un cervidé ailé au royaume des insectes. Ces appareils servent surtout lors des joutes des mâles pour conquérir une femelle, bien utiles pour renverser leur adversaire. Elles ne leur sont en revanche d'aucune utilité pour s'alimenter. Les petites mandibules des femelles sont, pour leur part, une véritable arme défensive pouvant briser les carapaces des prédateurs.

--

Espèces semblables : la petite biche (*Dorcus parallelipipedus*) ; caractères discriminants : dimorphisme sexuel discret, taille moins imposante (2 à 3 cm), antennes en massue (en peigne à 3 pointes chez le lucane), chez la femelle : carapace plus rugueuse, deux petits « points » et légère bosse non rugueuse sur le front de la tête.

▶ **Rhinocéros** (*Oryctes nasicornis*)

♂



♀

Les deux sexes de cette espèce présentent également un dimorphisme bien marqué. Les mâles disposent en effet d'une « corne » en bout de leur tête, ce qui leur vaut le surnom de scarabée « rhinocéros ». Les femelles sont plus discrètes et ont des mandibules à peine visibles.

**Caractères distinctifs**


- dimorphisme sexuel : présence chez le mâle d'une corne plus ou moins allongée et recourbée vers l'arrière (beaucoup plus petite chez la femelle)
- avant du thorax à l'aspect crevassé, même chez les femelles
- face ventrale poilue

Taille : 2 à 4 cm

Dates d'observation : mai à début septembre



## Hannetons (*Melolonthinae*)




### Caractères distinctifs

- allure générale de scarabée aux antennes<sup>2</sup> qui se terminent en forme de « peigne »
- élytres<sup>4</sup> ne recouvrant pas tout l'abdomen

Les hannetons sont des scarabées particulièrement massifs dont la présence ne passe pas inaperçue. Et c'est pourtant leur absentéisme saisonnier qui tend à se faire remarquer ces derniers temps. Le hanneton autrefois commun n'abonde plus comme jadis, c'est un fait. Mais il faut tout de même relativiser ces inquiétudes si l'on prend en compte le cycle relativement lent de la larve de cet insecte. En effet, tout comme les cigales, les hannetons adultes émergent tous en même temps de façon périodique, tous les trois ans environ. Il est donc normal, à un endroit donné, de n'observer que très peu de hannetons s'il y en a eu pléthores l'année précédente. Ceci dit, la larve a tout de même besoin de sols de bonne qualité afin de se développer et c'est justement la diminution de ces surfaces qui est à l'origine du déclin de ces insectes.

Taille : 2,5 à 3 cm

## Coccinelles (*Coccinellidae*)




### Caractères distinctifs

- corps à forme sphérique recouvrant les pattes
- présence de points sur les élytres<sup>4</sup>
- couleurs souvent vives
- arrivent en marchant ou volant

Sous leur apparence de doux petits insectes, les coccinelles et en particulier leurs larves sont en fait de véritables dévoreuses de hordes de... pucerons ! Bienheureux sont donc les jardiniers qui voient ces insectes patrouiller sur leurs rosiers. Ce n'est pas sans raison que les mains vertes surnomment cette alliée « bête à bon dieu ». Contrairement à une croyance largement répandue, les points sur leurs élytres ne correspondent pas à leur âge, mais sont de simples motifs alertant les prédateurs du mauvais goût des coccinelles et qui varient d'une espèce à une autre ou même parfois d'un individu à un autre.

Taille : 1 à 15 mm

## Dytiques (*Dysticidae*) et Hydrophiles (*Hydrophilinae*)



### Caractères distinctifs


- Silhouette arrondie et aspect de couleur noire luisante
- Présence d'élytres rigides recouvrant des ailes
- Pattes postérieures rameuses munies de franges de poils
- Arrivent en volant puis « ramant » sur le drap

Les dytiques et hydrophiles appartiennent à deux groupes de coléoptères bien distincts. Les premiers sont des prédateurs, tandis que les seconds sont majoritairement détritivores. Ceci dit, dytiques et hydrophiles ont tous la particularité d'être des insectes dont les larves et adultes sont adaptés à l'environnement aquatique. Mais ils sont, comme les punaises aquatiques, tellement attirés par la lumière qu'ils iront jusqu'à sortir de l'eau et ramer sur terre s'il y a présence d'une source lumineuse à proximité. Les adultes n'ont néanmoins pas perdu leur faculté à voler, celle-ci se révélant en effet utile lorsqu'il s'agit de changer de point d'eau.

Taille : 5 à 40 mm pour les dytiques,  
3 à 5 cm pour les hydrophiles



### Carabes (*Carabidae*)




#### Caractères distinctifs

- Corps allongé, de couleur noire ou cuivrée
- Longues antennes<sup>2</sup>
- Puissantes mandibules<sup>7</sup> pointées vers l'avant
- Déplacements vifs et rapides

Taille : 2 à 3 cm

Si vous étiez un insecte, la dernière des choses que vous souhaiteriez croiser est bel et bien un carabe ! De longues mandibules acérées, des yeux globuleux et la rapidité de ces insectes en font des prédateurs hors pairs dont très peu arrivent à en réchapper. A leur échelle, ce sont des insectes qui jouent un rôle de carnassiers au sommet de la chaîne alimentaire. Leur présence témoigne donc du bon état de santé des milieux dans lesquels ils se trouvent, car cela signifie qu'il ne manque aucun maillon à l'écosystème. Ces derniers s'observent d'ailleurs assez régulièrement de nuit aux pieds d'éclairages pour venir se servir en proies premièrement attirées par les lumières. Est-ce que les carabes (et autres insectes prédateurs) bénéficient de cette source de nourriture supplémentaire, ou souffrent-ils du fait que leurs proies diminuent ? Les deux hypothèses sont envisageables, et c'est justement ce type de problématiques que l'enquête « Insectes et Ciel étoilé » cherche à résoudre.

### Lampyres et lucioles (*Lampyridae*)



#### Caractères distinctifs

- Les œufs, larves (dits verts-luisants) et adultes peuvent être luminescents
- Adultes au corps mou et à l'aspect aplati
- Chez les mâles l'avant du thorax recouvre intégralement la tête
- Abdomen<sup>1</sup> allongé

Les lucioles et vers-luisants sont des coléoptères appartenant au groupe des lampyres. La nuit tombée, les femelles émettent une lumière verte du bout de leur abdomen, bien visible afin d'attirer les mâles qui ont pour leur part un signal lumineux plus discret. Ces derniers sont également munis d'yeux sensibles à de très faibles intensités lumineuses avec l'avant du thorax qui recouvre intégralement leur tête, protégeant ainsi de jour leur vue des rayons du soleil. Imaginez donc un peu la sensibilité de ses insectes face aux phénomènes de pollution lumineuse dans leurs milieux naturels ! Sachant qu'une simple bougie émet approximativement la même quantité de lumière que celle de 5000 lucioles réunies, le signal que perçoivent ces insectes à proximité de lampadaires à de quoi déboussoler. Ces insectes sont de véritables symboles en terme de biodiversité nocturne.

Taille : 1,5 à 2 cm

### Ver-luisant (*Lampyrus noctiluca*)



♂



♀

Chez ces coléoptères, les femelles sont néoténiques, c'est-à-dire que les adultes conservent des caractères larvaires, d'où leur surnom de « vers-luisants ». De fait, les femelles sont dépourvues d'ailes à l'état adulte mais se reproduisent et émettent même singulièrement plus de lumière que les mâles. Ces derniers volent à leur rencontre et les localisent grâce à une vue spécialement adaptée à l'obscurité. Les larves sont carnassières et se nourrissent essentiellement d'escargots et de limaces.

#### Caractères distinctifs

- individus luminescents
- la femelle n'a pas d'ailes et a une forme de larve
- le mâle a un aspect de coléoptère allongé, avec ailes, élytres et l'avant du thorax translucide qui recouvre la tête (comme chez les blattes)

Taille : 1,5 à 3 cm

Dates d'observation : juin à juillet



## Autres coléoptères

### Caractères distinctifs

- Présence d'élytres<sup>4</sup>

Taille : 2,5 à 3 cm

Chrysomèles, cétoines, longicornes, charançons, etc.

## NEVROPTÈRES

### Mantispes et planipennes (Nevroptères)



Les mantispes sont de bien curieux insectes, à l'aspect étrangement familier. En effet, ces sortes de « mouches » sont munies de pattes ravisseuses très semblables à celles des mantes religieuses. Cela leur donne une allure de chimères, de véritables minotaures au sein du règne des insectes. Ainsi, c'est un témoignage frappant mettant en évidence le fait que l'évolution des espèces peut parfois aboutir à des adaptations équivalentes suivant des contraintes écologiques similaires : on parle alors de convergence évolutive. Les autres insectes apparentés et appartenant au même groupe que les mantispes sont généralement appelés planipennes. Ils présentent une grande diversité de formes, allant même jusqu'à ressembler comme deux gouttes d'eau à des libellules. Faites bien attention à leurs antennes (invisibles chez les vraies libellules) pour les identifier à coup sûr.

### Caractères distinctifs

- 4 fines ailes transparentes et nervurées, de même taille, rabattues en toit au repos
- Planipennes parfois semblables à des libellules, mais s'en distinguent par leurs antennes plus ou moins longues, jointes à la base et/ou se terminant en « boules »
- Présence, chez les mantispes, de pattes ravisseuses munies de pinces et épines pour saisir les proies (comme chez les mantes)

Taille : 2 à 30 mm

## HYMÉNOPTÈRES

### Ichneumons (Ichneumonidae)



### Caractères distinctifs

- Sortes de guêpes au corps élancé, avec une taille très effilée
- Longues antennes<sup>2</sup>
- Présence, chez les individus femelles, d'un appendice (l'oviscapte<sup>8</sup>) fin et allongé au bout de l'abdomen<sup>1</sup>

Les ichneumons sont des « guêpes » parasites qui ne piquent pas, mais qui ont pour habitude de pondre leurs œufs dans le corps d'autres insectes. Les larves d'ichneumon se développent ensuite à l'intérieur ou l'extérieur du corps de l'hôte en préservant les parties vitales (système nerveux notamment) pour que l'infortuné insecte survive jusqu'à leur métamorphose en jeunes adultes. Il est dit qu'après avoir découvert ce macabre cycle de vie, Darwin lui-même aurait cessé de croire en Dieu. Ceci dit, ce sont des insectes très utiles en termes de lutte biologique pour éradiquer d'autres espèces d'insectes (principalement chenilles de Lépidoptères), sources de dégâts pour les activités humaines et ainsi permettre de limiter l'utilisation de pesticides.

Taille : 5 à 20 mm



## Fourmis (*Formicidae*)



### Caractères distinctifs

- Les fourmis ailées (sexués de la colonie) sont bien attirées par la lumière
- Une ou deux petites « boules » (pétioles<sup>9</sup>) visibles au niveau de la délimitation entre le thorax<sup>12</sup> et l'abdomen<sup>1</sup>
- Mandibules<sup>7</sup> très apparentes

Les fourmis sont des (les?) insectes sociaux par excellence, aucune espèce de fourmi n'étant solitaire à proprement parler. Très apparentées aux guêpes, certaines d'entre elles ont conservé un dard avec lequel elles peuvent piquer. D'autres éjectent de l'acide formique directement depuis leur abdomen. Avec leurs troupes de pucerons ou les champignons qu'elles font pousser dans leurs fourmilières, ces insectes avaient déjà inventé l'agriculture et l'élevage bien avant que l'homme ne fasse son apparition. En fin des chaudes journées d'été, par temps humide, généralement juste avant un orage, ce sont des centaines de fourmis ailées (stades sexués) qui prennent leur envol pour s'accoupler. C'est suite à ce vol nuptial que la « reine » partira en quête d'un emplacement propice pour fonder une nouvelle colonie.

Taille : 1 à 20 mm

## Abeilles et bourdons (*Apoidea*)



### Caractères distinctifs

- Abdomen<sup>1</sup> souvent poilu, éventuellement orné de zébrures transversales
- Aspect global plus compact que les guêpes
- Mandibules<sup>7</sup> non apparentes

Que dire sur les abeilles qui ne soit déjà connu de tous ? L'abeille est bien l'un des rares insectes à avoir été domestiqué à des fins agricoles. Elle nous sert, entre autres, à la production de miel. Mais elle joue aussi un rôle majeur en tant qu'insecte pollinisateur. Parmi les espèces d'abeilles, beaucoup sont solitaires et contribuent tout autant que les abeilles sociales à la fécondation des plantes entomophiles (dont la pollinisation dépend des insectes), dont les populations dépériraient sans leur intervention. Les bourdons sont même utilisés dans les serres maraîchères où se pratique une agriculture raisonnée. Toutes espèces confondues, malgré les prodigieux services rendus aux maraîchers et autres agriculteurs, les abeilles et bourdons sont menacés par l'agriculture intensive, les systèmes de monocultures et l'épandage massif de pesticides généralistes.

Taille : 5 à 15 mm pour les abeilles,  
1 à 2,5 cm pour les bourdons

## Guêpes et frelons (*Vespidae*)



### Caractères distinctifs

- Mandibules<sup>7</sup> bien visibles
- Fine taille entre le thorax<sup>12</sup> et l'abdomen<sup>1</sup>
- Abdomen<sup>1</sup> sans poils, orné de vives zébrures

Ces espèces possèdent un dard lisse, capable de piquer plusieurs fois contrairement aux abeilles. En leur présence, évitez les mouvements brusques afin de ne pas vous attirer leur courroux. Ne produisant pas de miel, les guêpes n'en restent pas moins attirées par les aliments sucrés. Globalement ce sont des prédateurs d'autres insectes (abeilles, mouches, etc.). Les guêpes peuvent, par exemple, ajouter à leur menu quelques insectes connus pour leurs dommages causés sur les cultures. Elles ramènent ensuite les proies au nid pour nourrir les larves de leur colonie. À la différence des abeilles, leurs colonies ne durent généralement qu'une seule année (elles n'hivernent pas). Le matériau utilisé pour construire le nid est une sorte de « carton » mâché par les ouvrières, constitué de bois et de leur propre salive. La fabrication de notre propre papier, à base de cellulose de bois, est somme toute basée sur le même principe que celui de ces insectes.

Taille : 1 à 2 cm pour les guêpes,  
2 à 3 cm pour les frelons



### Frelon européen (*Vespa crabro*)



#### Caractères distinctifs

- corps noir et brun/rougeâtre du thorax jusqu'au début de l'abdomen
- abdomen à dominante jaune

Les frelons sont bien connus comme étant de voraces prédateurs d'abeilles et d'autres insectes qu'ils chassent pour nourrir leurs larves. Attention à ne pas confondre cette espèce avec les *Vespa velutina*, le frelon asiatique, moins attirés par la lumière de votre lampe mais pourtant tristement célèbres pour leurs nids aux dimensions démesurées et les ravages qu'ils occasionnent aux ruches des apiculteurs.

--

Espèces semblables : le frelon asiatique (*Vespa velutina*) ; caractères discriminants : pattes aux extrémités jaunes et corps à dominante noire

Taille : 1,5 à 3 cm

Dates d'observation : toute l'année, sauf en hiver et par temps froid (<12°C)

## HYMÉNOPTÈRES

### Mouches et syrphes (*Brachycera*)



#### Caractères distinctifs

- 2 gros yeux prenant quasiment toute la tête
- Antennes<sup>2</sup> minuscules
- 1 seule paire d'ailes nettement visibles

NB : Les syrphes ressemblent à s'y méprendre à des guêpes ou abeilles. Pour les en distinguer à coup sûr il suffit de constater la présence de leurs gros yeux et l'absence notable de leur paire d'antennes.

Bien qu'incommodantes et souvent associées à la saleté et l'insalubrité, les mouches jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes de par leur régime alimentaire souvent constitué de matière organique en décomposition. L'aptitude des mouches pour le vol est en partie due au fait qu'elles disposent d'une paire d'haltères leur permettant de virer de bord très brusquement. À taille égale, même les plus manœuvrables des hélicoptères ne pourraient rivaliser. Et comme la nature fait bien les choses, ajoutez à cela une vision des plus perfectionnée (panoramique). Cela en fait bel et bien l'un des insectes des plus aptes à éviter les foudres de la personne agacée par le vrombissement de ses ailes. Remarquez que certaines mouches pollinisatrices, les syrphes, préfèrent arborer des motifs copies-conformes à ceux des abeilles et guêpes pour éviter toute confrontation et dissuader d'éventuels prédateurs.

Taille : 1 à 15 mm pour les mouches, 5 à 20 mm pour les syrphes



## Moustiques (*Culicidae*)




### Caractères distinctifs

- Petite tête et thorax<sup>2</sup> bombé
- Longues pattes
- Longueur de l'individu inférieure à 1,5cm
- Trompe piqueuse pointée vers l'avant

Taille : 3 à 10 mm

Proches parents des mouches, les moustiques ont ceci en commun qu'ils font généralement beaucoup de bruit en volant. L'appareil buccal est constitué d'une trompe rigide, particulièrement longue chez les femelles car elle leur sert à transpercer la peau et aspirer le sang de vertébrés ou même l'hémolymphe (le « sang ») d'autres insectes. Chez les femelles, ce repas est en effet une source indispensable en nutriments pour assurer le développement de leurs œufs avant la ponte. En revanche, les moustiques mâles ne vous piqueront pas car ils se nourrissent exclusivement de substances sucrées tel que le nectar des fleurs. Pour restreindre les piqûres, sachez que les odeurs dégagées par certaines plantes odorantes sont insupportables aux moustiques. Restez donc à bonne distance des points d'eau stagnante et utilisez quelques gouttes d'huiles essentielles dissuasives (citronnelle, citron, bois de cèdre, pin, lavande, eucalyptus, etc.) à appliquer sur la peau.

## Tipules (*Tipulomorpha*)



### Caractères distinctifs


- Aspect d'un gros moustique
- Très longues pattes, pendantes en vol
- 1 paire de grandes ailes et une paire d'haltères<sup>6</sup> bien évidentes

Taille : 1 à 4 cm

Aussi nommés « cousins », les tipules sont effectivement de proches cousins des moustiques auxquels ils ressemblent comme deux gouttes d'eau... mais en beaucoup plus gros ! Certains spécimens de la plus grande espèce de tipule en France (*Tipula maxima*) atteignent 40mm de longueur. Bien heureusement, ces insectes ne piquent pas, les adultes mâles et femelles se contentent de repas liquides et sucrés. Les larves, pour leur part, vivent dans les sols humides et frais où elles se délectent des racines et tubercules à leur disposition. C'est pour cela que les tipules sont parfois considérées comme des ravageurs de cultures. Pourtant, en milieu naturel, les larves participent activement au renouvellement de l'humus et à l'aération du sol. Si vous en attrapez, remarquez les ailes postérieures modifiées appelées haltères.

## TRICHOPTÈRES

## Phryganes (*Trichoptères*)



Les phryganes ressemblent à s'y méprendre à de petits papillons de nuits (cf. microlépidoptères). Mais contrairement à ceux-ci, en plus des caractères distinctifs des adultes, les larves de phryganes sont aquatiques. Elles confectionnent, au moyen de débris végétaux et de la soie qu'elles produisent, des petits fourreaux qui leur serviront de retraite face aux prédateurs.

### Caractères distinctifs

- Longues antennes<sup>2</sup>, quasi jointes à la base, maintenues vers l'avant
- Ailes striées recouvertes de poils, disposées en forme de toit au repos
- Grandes pattes arrières portant des « épines » bien visibles

Taille : 5 à 30 mm



## LÉPIDOPTÈRES

### Papillons (*Lépidoptères*)

Insectes colorés, les seuls ayant des écailles (donnant la couleur) sur les ailes (« poudre » qui tombe lorsqu'ils se frottent).

Les papillons sont le fruit d'une lente et longue co-évolution, avec les plantes à fleurs, dont certaines vont même jusqu'à ne s'ouvrir que la nuit pour être pollinisées exclusivement par des papillons de nuit qu'elles attirent grâce à leur couleur (généralement blanche) et leur parfum.

Pour environ 5 000 espèces de papillons présentes sur le territoire français, il en existe moins de 300 à activité diurne, le reste représentant des espèces de nocturnes.

*NB : Longues antennes « en massue » chez les papillons dits « de jour », « non en massue » pour les papillons « dits de nuit ».*

### Géomètres (*Geometridae*)



*Envergure : 1,5 à 2,5 cm*

Les différents motifs et couleurs des robes des géomètres, aussi appelés phalènes, servent souvent à les confondre avec le support sur lequel ils se posent, ceci pour leur permettre d'échapper aux prédateurs diurnes tant qu'ils ne bougent pas. Ainsi certaines ont des couleurs d'écorce, d'autre de feuilles. D'autres, blancs, ainsi posés sur une feuille seront mimétiques des fientes d'oiseaux donc non détectés par ces derniers.

#### Caractères distinctifs

- 4 ailes visibles et à plat au repos
- Généralement motifs des ailes antérieures qui se poursuivent sur les ailes postérieures
- Papillons frêles au vol et battements d'ailes peu rapides

### Phalène du bouleau

(*Biston betularia*)



#### Caractères distinctifs

- ailes longues et étroites, de couleur plus ou moins blanchâtre, tachetées, avec le bord orné de quelques bandes noires
- allure en forme de triangle au repos

Papillon bien connu pour les variations de teintes tantôt claires tantôt sombres de ses ailes. Lors de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, au XIX<sup>ème</sup> siècle, les dépôts de suie des usines à charbon assombrissaient les bouleaux sur lesquels se posaient les phalènes. Il fut alors constaté que les spécimens de cette espèce avaient globalement noirci au détriment des spécimens les plus clairs. Ce changement de couleur leur aurait en effet permis de mieux se camoufler et donc d'échapper aux prédateurs dans leur nouvel environnement. Ce cas est souvent cité dans les manuels scolaires comme exemple d'adaptation des espèces au milieu naturel par mutation puis sélection naturelle.

*Envergure : 42-60 mm*

*Dates d'observation : avril à juillet*



### Citronnelle rouillée

(*Opisthoptis luteolata*)



#### Caractères distinctifs

- papillons de couleur jaune
- 4 taches rousses et une tâche de rouille grisâtre centrée sur le bord de chaque aile antérieure

Espèce cosmopolite que l'on trouve dans de nombreux habitats et pouvant même parfois être aperçue de jour. Les larves se nourrissent sur des plants d'aubépines et prunelliers, puis tissent à même le sol un cocon très résistant pour muer en chrysalides. Les adultes émergeront et, en fonction des conditions du milieu, pourront engendrer une à deux autres générations chevauchantes. Ce cycle de vie complexe permet à ces papillons d'émerger sur une large période tout au long de l'année.

Envergure : 33-46 mm

Dates d'observation : avril à octobre en 1, 2 ou même 3 générations

### Sphinx (*Sphingidae*)



#### Caractères distinctifs

- Silhouette en forme de pointe de flèche au repos
- Ailes postérieures bien plus petites que les antérieures
- Vol battu très rapide et précis
- Papillons gros à très gros
- Antennes<sup>2</sup> courtes

Les sphinx sont de gros papillons de nuit au corps fusiforme. Certains d'entre eux sont diurnes butinant comme les espèces nocturnes d'une manière tout à fait caractéristique : ils ne se posent pas sur la fleur mais font du sur-place et déroulent leur trompe pour atteindre le nectar, de sorte qu'ils sont parfois pris pour des colibris. Plusieurs sphinx ont des ailes postérieures aux motifs éclatants qu'ils utilisent pour troubler leurs prédateurs dès qu'ils se sentent menacés. Ils rabattent ainsi successivement leurs ailes antérieures sur les postérieures afin de couvrir et découvrir les motifs de façon alternée et plus ou moins rapide. Le terme « sphinx » vient de la posture prise par la plupart des chenilles de cette famille.

Envergure : 4 à 14 cm

### Grand sphinx de la vigne

(*Deilephila elpenor*)



#### Caractères distinctifs

- papillons de couleur jaune
- 4 taches rousses et une tâche de rouille grisâtre centrée sur le bord de chaque aile antérieure

La couleur éclatante de ce sphinx le fait ressortir parmi tout ce qui l'entoure dans son environnement. L'intérêt pour l'espèce étant surtout que les fleurs d'une de ses plantes hôtes, les épilobes par exemple, sont en parfaite adéquation avec cette teinte, lui permettant ainsi de se camoufler. A noter que lorsqu'elle se sent menacée, la chenille de ce papillon adopte une allure caractéristique, ressemblant à celle d'un serpent pour effrayer les prédateurs.

Envergure : 50-70 mm

Dates d'observation : mai à septembre, une ou deux générations



### Sphinx du peuplier

(*Laothoe populi*)



Le sphinx du peuplier cherche, comme son cousin du tilleul (*Mimas tiliae*) à passer inaperçu dans son habitat. A ceci près qu'il ne possède pas exactement les mêmes motifs militaires et se trouve généralement à proximité des peupliers plutôt que des tilleuls.

#### Caractères distinctifs

- ailes postérieures « découpées » et dépassant au-dessus des antérieures au repos

Envergure : 70-100 mm ; mâle plus petit (32 à 38 mm)

Dates d'observation : mai à septembre, une ou deux générations

### Sphinx du tilleul

(*Mimas tiliae*)



Le sphinx du tilleul se débusque facilement autour des arbres de même non. Il possède une livrée « militaire » tachetée de beige, marron et verdâtre lui permettant de se confondre dans la végétation.

#### Caractères distinctifs

- motifs de type « camouflage militaire »
- bord festonné (découpe caractéristique) des ailes postérieures

Envergure : 60-80 mm ; mâle plus petit (25 à 33 mm)

Dates d'observation : avril à septembre, une ou deux générations

### Microlépidoptères



Les groupes de papillons compris dans cet ensemble n'ont en commun que leur très petite taille. On y retrouve aussi bien les teignes (ou « mites ») que les pyrales, tordeuses et d'autres petits lépidoptères aux fonctions diverses et variées au sein de leurs écosystèmes respectifs. Ce seront sans doute ces petits papillons que vous retrouverez en majorité sur votre drap. Et pour cause, il en existe environ 1500 espèces, soit  $\frac{3}{4}$  des espèces de lépidoptères recensées en France !

#### Caractères distinctifs

- Papillons à l'envergure moyenne maximum de 1,5 cm



## Autres lépidoptères

### Caractères distinctifs

- Papillons ayant une taille comprise entre 1,5 cm et 15 cm d'envergure

### Écaille chinée

(*Euplagia quadripunctaria*)



Espèce cosmopolite, présente un peu partout sur le territoire français, jusque dans les zones urbanisées. Comble pour une espèce de papillon dit « de nuit », les adultes sont essentiellement actifs de jour. Ils seront cependant bien attirés par votre lampe s'ils se trouvent dans les environs.

### Caractères distinctifs

- ailes antérieures noires zébrées de blanc / jaune pâle
- ailes postérieures rouges avec quelques gros points noirs

Envergure : 40-65 mm

Dates d'observation : juillet à septembre,  
une génération

### Méticuleuse

(*Phlogophora meticulosa*)



Ce papillon consomme un grand nombre de plantes différentes et n'est pas lié à un habitat spécifique. Certains spécimens vont même jusqu'à migrer vers le nord de la France en été.

### Caractères distinctifs

- triangles olivâtres sur les ailes antérieures
- extrémité des ailes racornie au repos

Envergure : 60-80 mm ; mâle plus petit (25 à 33 mm)

Dates d'observation : mars à novembre, en plusieurs  
(2-3) générations

### Museau

(*Pterostoma palpina*)



Au repos, cette espèce replie ses ailes beiges et brunâtres à la verticale, contre son corps. De cette manière le papillon se confond aisément avec un morceau de bois desséché. Le nom commun « Museau » vient de sa tête atypique chez les gros papillons, avec des palpes (rôles de senseurs) allongés lui donnant un « nez ».

### Caractères distinctifs

- présence d'un museau (« corne ») en avant de la tête
- ailes repliées à la verticale au repos

Envergure : 30-55 mm, mâle plus petit (15 à 25 mm)

Dates d'observation : avril à septembre, en deux générations



## Grand paon de nuit

(*Saturnia pyri*)



C'est le plus grand papillon d'Europe. La nuit, en vol, il fait penser à une chauve-souris. Une espèce très proche, le petit paon de nuit (*Saturnia pavonia*) lui ressemble mais est bien plus petite (50-65 mm d'envergure).

---  
Espèces semblables : le petit paon de nuit (*Saturnia pavonia*)

### Caractères distinctifs

- très grande taille
- 4 « yeux » (ocelles) non entourés de blancs sur les ailes

Envergure : 120-150 mm

Dates d'observation : avril à juin en une génération

## Batis

(*Thyatira batis*)



Malgré le qualificatif anglais « fleur de pêche » donné à cette espèce, la chenille de ce papillon se nourrit exclusivement de feuilles de ronce et fréquente donc les espaces ouverts et boisés où poussent ses plantes préférées.

### Caractères distinctifs

- chaque aile antérieure ornée de 4 taches rousses entourées de blanc-crème sur un fond de couleur brunâtre

Envergure : 32-38 mm

Dates d'observation : mai à septembre en une ou deux générations

## Zeuzère du poirier (ou marronnier)

(*Zeuzera pyrina*)



La chenille se développe en 2 ans dans les troncs et branches de presque toutes les espèces d'arbres autochtones. Espèce parfois cataloguée comme « nuisible » souvent à tort, les arbres succombant étant habituellement des sujets fragiles alors terrassés par un ensemble d'organismes.

### Caractères distinctifs

- papillon aux ailes et corps blanc tachetés de noir
- corps dépasse visiblement des ailes au repos

Envergure : 50-60 mm, mâle plus petit (35-40 mm)

Dates d'observation : mai à août en une génération

## Autres insectes

### Caractères distinctifs

- 3 paires de pattes

Blattes, pléocoptères, mantes, phasmes, termites, libellules, autres petites bêtes à six pattes, etc.

## Autres arthropodes

### Caractères distinctifs

- Présence de pattes articulées
- Squelette externe (carapace)

Cloportes, lépismes, araignées, opilions, myriapodes, etc.




### LA CONSTELLATION DU LION : REPÉRAGE DES 16 ÉTOILES À OBSERVER

Les étoiles à observer sont numérotées sur le schéma de 1 à 16.

De façon à mieux repérer les étoiles de la constellation, l'étoile la plus brillante nommée Regulus est indiquée sur la carte de la constellation. Pour la repérer, c'est facile, elle est située sous la Grande Ourse.

Sur la fiche de terrain vous sont demandées les étoiles que vous avez pu observer parmi les 16 de la constellation. Cette mesure servira à établir un indicateur de la qualité du ciel.



Constellation du Lion © AFA | M.Evanno




## LA CONSTELLATION DE LA VIERGE : REPÉRAGE DES 15 ÉTOILES À OBSERVER

Les étoiles à observer sont numérotées sur le schéma de 1 à 15.

De façon à mieux repérer les étoiles de la constellation, l'étoile la plus brillante nommée Spica est indiquée sur la carte de la constellation. Pour la repérer, il suffit de prolonger l'arc de cercle du manche de la Casserole (de la Grande Ourse), on trouve sur son chemin Arcturus du Bouvier puis Spica de la Vierge.

Sur la fiche de terrain vous sont demandées les étoiles que vous avez pu observer parmi les 15 de la constellation. Cette mesure servira à établir un indicateur de la qualité du ciel.




Constellation de la Vierge © AFA | M.Evanno



**CARTE DU CIEL ET REPÉRAGE DE LA CONSTELLATION DU LION ET DE LA VIERGE**

**Pour retrouver le Cygne !**

1. A partir de la carte du ciel de l'hémisphère nord, repérer la constellation du Cygne. Son étoile principale Deneb est l'une des trois composantes du Triangle de l'été avec Véga et Altair. Une de ses ailes borde la Voie Lactée !
2. Puis se reporter sur la carte de champ spécifique de cette constellation, aux horaires de début d'observation spécifiés dans le guide technique






## LA CONSTELLATION DU CYGNE : REPÉRAGE DES 15 ÉTOILES À OBSERVER

Les étoiles à observer sont numérotées sur le schéma de 1 à 15.

De façon à mieux repérer les étoiles de la constellation, l'étoile la plus brillante nommée Deneb est indiquée sur la carte de la constellation. Elle est facilement visible dans le ciel nocturne et permet un repérage efficace des autres étoiles à observer.

Sur la fiche de terrain vous sont demandées les étoiles que vous avez pu observer parmi les 15 de la constellation. Cette mesure servira à établir un indicateur de la qualité du ciel.






## CARTE DU CIEL ET REPÉRAGE DE LA CONSTELLATION DU CYGNE

### Pour retrouver le Cygne !

1. A partir de la carte du ciel de l'hémisphère nord, repérer la constellation du Cygne. Son étoile principale Deneb est l'une des trois composantes du Triangle de l'été avec Véga et Altair. Une de ses ailes borde la Voie Lactée !
2. Puis se reporter sur la carte de champ spécifique de cette constellation, aux horaires de début d'observation spécifiés dans le guide technique






## CARTE DU CIEL ET REPÉRAGE DE LA CONSTELLATION DU CYGNE

### Pour retrouver le Cygne !

1. A partir de la carte du ciel de l'hémisphère nord, repérer la constellation du Cygne. Son étoile principale Deneb est l'une des trois composantes du Triangle de l'été avec Véga et Altair. Une de ses ailes borde la Voie Lactée !
2. Puis se reporter sur la carte de champ spécifique de cette constellation, aux horaires de début d'observation spécifiés dans le guide technique





## LES FICHES D'AIDE

1. Bon à savoir
2. Mémo identification
3. Mémo visuel
4. Débuter en astro
5. Le cycle lunaire
6. Glossaire
7. Schéma insecte



# 1. Fiche d'aide • Bon à savoir

Cette partie du guide utilisateur « Insectes & Ciel étoilé » vous présente les groupes d'insectes que vous serez susceptibles de voir sur le drap, ainsi que tout les outils pour vous permettre de les identifier.

## > Comment identifier un insecte ?

Le groupe des insectes rassemble en Europe plus de 100 000 espèces différentes. Chaque espèce appartient à un ensemble de groupes, qui s'emboîtent et se définissent selon des caractéristiques communes. Lorsque l'on identifie un insecte, on détermine selon des critères d'identification à quel groupe il appartient.



Les araignées par exemple possèdent 8 pattes articulées et n'ont pas d'antennes. Ce sont donc des arthropodes, mais pas des insectes ! Le Grillon champêtre, lui, est un insecte de l'ordre des orthoptères (cf. figure à droite)



## > Faut-il aller jusqu'à l'espèce ?

Une fois l'insecte repéré sur le drap, tout le jeu va donc être de l'identifier en le classant dans un de ces groupes, puis de le reporter sur la fiche terrain (p. xx). Attention, identifier jusqu'à l'espèce est souvent difficile et affaire de spécialiste en entomologie. Mais rassurez-vous ! La découverte de l'environnement nocturne et du monde fascinant des insectes est accessible à tous. En effet, dans « Insectes & Ciel étoilé », nous vous proposons de classer les insectes en fonction de leur groupe, sans forcément aller jusqu'à l'espèce. Ce sont déjà des informations très intéressantes pour les scientifiques ! Et, lorsque c'est possible de les reconnaître facilement, certains exemples d'espèces sont présentés.

Attention : un nombre de groupe important est présenté dans ce guide, et il est fort possible que vous ne les rencontriez pas tous sur votre drap ! Mais ne vous découragez pas, toutes vos observations seront déterminantes pour comprendre l'impact de l'éclairage nocturne sur la biodiversité.

## LES OUTILS POUR IDENTIFIER LES INSECTES

- Un **glossaire** (p. xx) et un **schéma** (p. xx) : savoir quelle partie regarder chez l'insecte pour l'identifier et utiliser les bons termes. Ils vous seront d'une grande utilité pour lire et comprendre les descriptifs détaillés et les critères d'identification
- **Fiche d'aide à l'identification** (p. xx) : présente tous les groupes d'insectes de l'enquête, de manière synthétique sur une seule page, avec les silhouettes correspondantes. Une fois que vous pensez avoir repéré votre insecte, vous pouvez vous référer aux descriptions détaillées dans le guide d'identification.
- **Fiche d'aide visuelle** (p. xx) : pour vous repérer vous pouvez également utiliser cette fiche d'aide visuelle qui présente des silhouettes et des photos pouvant vous aider dans l'identification.
- **Guide d'identification insectes** (p. xx à p.xx) : plus complet, c'est le guide à utiliser pour valider vos identifications. Il présente les principaux caractères distinctifs, la taille, une silhouette et/ou une photo ainsi qu'un petit paragraphe descriptif vous permettront d'identifier les groupes d'insectes et certaines espèces (signalées par une flèche violette)



# 1. Fiche d'aide • Bon à savoir

## L'INSECTE EST IDENTIFIÉ ?

Bravo ! Vous pouvez le reporter sur la fiche terrain **p.xx**.

## ENCORE UN DOUTE ?

D'autres outils peuvent vous aider !

### > La photo : un outil d'aide à l'identification

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter vos observations par des photographies pour faciliter les identifications. Vous pouvez soumettre vos clichés sur le forum « Papillons & Jardin »\*, pour partager vos observations ou demander de l'aide sur une identification. Vous pouvez aussi nous adresser vos photos à l'adresse [ice@noeconservation.org](mailto:ice@noeconservation.org) : nous publierons régulièrement vos plus belles réalisations, sur Facebook et sur les autres moyens de communication de l'enquête Insectes & Ciel étoilé !



#### *Astuce : comment photographier les insectes sur le drap ?*

Bien que l'observation se déroule la nuit, le drap blanc éclairé vous permettra avec un peu d'entraînement de faire de beaux clichés avec un simple appareil compact, en mode automatique et sans trépied. L'utilisation éventuelle du flash vous permettra de mieux percevoir les couleurs des insectes et d'éviter d'éventuels flous.

En complément de vos photographies d'insectes seuls, des vues d'ensemble avec plusieurs individus sont utiles pour comparer les insectes entre eux. Elles permettent aussi d'évaluer l'attractivité du dispositif lumineux, en comparant par exemple les clichés à différents moments.

### > Pour aller plus loin

Des guides peuvent vous aider dans l'identification et vous apporter plus d'informations sur les insectes observés. Ils proposent de nombreuses illustrations, mais aussi des détails sur la biologie ou la répartition des espèces. De plus, ils aident à éviter les confusions possibles. Pour les utiliser efficacement, il est préférable de bien noter les caractéristiques des insectes observés ou de prendre des photographies.

Quelques références (vont être complétées par l'OPIE cette semaine).

#### *Livres*

- « **Insectes de France et d'Europe occidentale** » de Michael Chinery, édition Flammarion
- « **Insectes de France et d'Europe** » de Wolfgang Dierl et Werner Ring, édition Delachaux et Niestlé.
- Pour un budget léger : guides « **petit atlas des...** », disponibles pour plusieurs catégories d'insectes, édition Delachaux et Niestlé.
- Pour vous aider à débiter dans l'observation des insectes : « **Bien débiter en entomologie** » de Vincent Albouy, édition Glénat.

#### *Sites web*

- le site de l'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) : **insectes.org**
- le site du Spipoll : Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs, qui propose une clef d'identification des insectes : **spipoll.fr**
- les papillons de Poitou Charentes :
- **papillon-poitou-charentes.org**

\* Le forum « Papillons & Jardin » [papillonsetjardin.org](http://papillonsetjardin.org), régulièrement consulté et animé par Noé et des spécialistes, propose différentes discussions sur le jardin et les papillons en général. Il comprend une rubrique spécifique « Insectes & Ciel étoilé » (pour poser vos questions sur l'enquête, échanger avec les observateurs) de même qu'une rubrique dédiée à l'identification des papillons de nuit et des insectes nocturnes.



## 2. Fiche d'aide • Mémo identification



Silhouette(s) type	Ordres	Groupes	Espèces
	<b>Ephéméroptères (p.xx)</b> Ordre des éphémères, 3 à 4 cm de long, ne volent pas très bien et possèdent de très longues « queues », ou cerques, à l'extrémité de l'abdomen		
	<b>Dermaptères (p.xx)</b> Ordre des perce-oreilles, reconnaissables par leur corps allongé au bout duquel sont présentes deux pinces abdominales, (ou forceps) caractéristiques		
	<b>Orthoptères (p.xx)</b> Ordre caractérisé notamment par des pattes arrière sauteuses très développées	Courtilières (p.xx)	
		Grillons (p.xx)	Grillon champêtre (p.xx)
		Criquets (p.xx)	
		Sauterelles et Éphippigères (p.xx)	Conocéphale gracieux, (p.xx) Grande sauterelle verte (p.xx)
	<b>Hemiptères (p.xx)</b> Insectes « piqueurs » se nourrissant grâce à leur appareil buccal en forme de petite aiguille (rostre)	Punaises (p.xx)	
		Notonectes et Corixes (p.xx)	
		Cigales et Cicadelles (p.xx)	Grand diable (p.xx)
	<b>Coléoptères (p.xx)</b> Reconnaissables grâce à leurs ailes antérieures, les élytres, qui sont épaissies et cornées, donnant l'aspect d'une « carapace » sur le dos de l'animal	Scarabées (p.xx)	Lucane cerf-volant, (p.xx) Rhinocéros (p.xx)
		Hannetons (p.xx)	
		Coccinelles (p.xx)	
		Dytiques et Hydrophiles (p.xx)	
		Carabes (p.xx)	
		Lampyres et Lucioles (p.xx)	Ver-luisant (p.xx)
		Autres (p.xx)	
	<b>Nevroptères (p.xx)</b> Ailes membraneuses très nervurées formant une sorte de réseau	Mantispes et Planipennes (p.xx)	
	<b>Hyménoptères (p.xx)</b> Ordre des guêpes, fourmis, abeilles... La plupart des groupes sont reconnaissable grâce à leur « taille de guêpe », qui en fait un étranglement de l'abdomen.	Ichneumons (p.xx)	
		Fourmis (p.xx)	
		Abeilles et bourdons (p.xx)	
		Guêpes et Frelons (p.xx)	Frelon européen (p.xx)
	<b>Diptères (p.xx)</b> Ordre des mouches, ne possèdent qu'une seule paire d'aile: la seconde étant réduite à l'état de petit « balanciers ». D'où le nom de cet ordre : « di » pour « deux » et « ptères » pour « ailes ». Taille des yeux généralement importante par rapport à la tête.	Mouches et Syrphes (p.xx)	
		Moustiques (p.xx)	
		Tipules (p.xx)	
	<b>Trichoptères (p.xx)</b> Ordre des phryganes, à ne pas confondre avec des microlépidotères !		
	<b>Lépidoptères (p.xx)</b> C'est l'ordre des papillons de jour (rhopalocères) – mais vous ne devriez pas en croiser ! – et des papillons de nuit (hétérocères)	Géomètres (p.xx)	Phalène du bouleau, (p.xx) Citronnelle rouillée (p.xx)
		Sphinx (p.xx)	Grand Sphinx de la vigne (p.xx), Sphinx du Peuplier (p.xx), Sphinx du tilleul (p.xx)
		Microlépidoptères (p.xx)	
		Autres	



### 3. Fiche d'aide • Mémo visuel (1/4)

#### EPHÉMÉROPTÈRES



#### Éphémères




3 à 40 mm  
(sans les cerques)

#### DERMAPTÈRES



#### Perce-oreilles



1 à 2,5 cm

#### ORTHOPTÈRES



#### Courtilières



3 à 6 cm




#### Grillon champêtre *Gryllus campestris*



~1,5 à 2 cm

#### Autres grillons



1 à 2,5 cm

#### Criquets



1,5 à 7 cm

#### Grande sauterelle verte *Tettigonia viridissima*




longueur du corps ~3 à 4 cm

#### Conocéphale gracieux *Ruspolia nitidula*



longueur du corps ~2 à 3 cm

#### Autres sauterelles et éphippigères




3 à 4 cm (6 cm ailes comprises)



#### HÉMIPTÈRES




#### Punaises



5 à 15 mm

#### Notonectes et corixes



1,5 cm



#### Grand diable *Ledra aurita*



~1,5 cm

#### Autres cigales et cicadelles



1,5 à 3 cm pour les cigales, 3 à 13 mm pour les cicadelles





## COLÉOPTÈRES

**Lucane cerf-volant**  
*Lucanus cervus*



♀ ♂

3 à 8 cm


**Rhinocéros**  
*Oryctes nasicornis*



♂ ♀

2 à 4 cm

**Autres scarabés**



1 à 4 cm

**Coccinelles**



1 à 15 mm

**Dytiques et hydrophiles**




5 à 40 mm pour les dytiques,  
3 à 5 cm pour les hydrophiles

**Carabes**



2 à 3 cm

**Ver luisant**  
*Lampyris noctiluca*



♂ ♀


1,5 à 3 cm

**Autres lampyres et lucioles**



Taille : 1,5 à 2 cm

**Hannetons**



2,5 à 3 cm

**Autres coléoptères**

Chrysomèles,  
cétaines, longicornes,  
charaçons, etc.

1 mm à 4,5 cm

## NEVROPTÈRES


**Mantispes et planipennes**



2 à 30 mm

## HYMÉNOPTÈRES

**Ichneumons**




5 à 20 mm




### 3. Fiche d'aide • Mémo visuel (3/4)

**Fourmis**



1 à 20 mm

**Abeilles et bourdons**



5 à 15 mm pour les abeilles, 1 à 2,5 cm pour les bourdons

**Frelon européen**  
*Vespa crabro*



~1,5 à 3 cm

**Autres Guêpes et frelons**



1 à 2 cm pour les guêpes,  
2 à 3 cm pour les frelons

**DIPTÈRES**



**Mouches et syrphes**



1 à 15 mm pour les mouches, 5 à 20 mm pour les syrphes

**Moustiques**



3 à 10 mm

**Tipules**



1 à 4 cm

**TRICHOPTÈRES**



**Phryganes**



5 à 30 mm

**LÉPIDOPTÈRES**



**Phalène du bouleau**  
*Biston betularia*



Envergure 42-60 mm

**Citronnelle rouillée**  
*Opisthograptis luteolata*



Envergure : 33-46 mm

**Autres géomètres**



Envergure : 1,5 à 2,5 cm

**Grand sphinx de la vigne**  
*Deilephila elpenor*



Envergure : 50-70 mm

**Sphinx du peuplier**  
*Laothoe populi*



Envergure 70-100 mm ;  
mâle plus petit (32 à 38 mm)

**Sphinx du tilleul**  
*Mimas tiliae*



Envergure 60-80 mm ;  
mâle plus petit (25 à 33 mm)

**Autres sphinx**



Envergure : 4 à 14 cm

**MICRO-LÉPIDOPTÈRES**





### 3. Fiche d'aide • Mémo visuel (4/4)

#### Microlépidoptères



Envergure moyenne maximum : 1,5 cm

#### AUTRES LÉPIDOPTÈRES



#### Écaille chinée

*Euplagia quadripunctaria*



Envergure : 40-65 mm

#### Méticuleuse

*Phlogophora meticulosa*



Envergure : 40-50 mm

#### Museau

*Pterostoma palpina*



Envergure 30-55 mm, mâle plus petit (15 à 25 mm)

#### Grand paon de nuit

*Saturnia pyri*



Envergure : 120-150 mm

#### Batis

*Thyatira batis*



Envergure : 32-38 mm

#### Zeuzère du poirier

*Zeuzera pyrina*



Envergure : 50-60 mm mâle plus petit (35-40 mm)

#### AUTRES INSECTES

Blattes, plécoptères, mantes, phasmes, termites, libellules, autres petites bêtes à six pattes, etc.

#### AUTRES ARTHROPODES

Cloportes, poissons d'argent, araignées, opilions, mille-pattes, etc.

Crédits pour les photos d'insectes :

#### Groupes

Anoplotrupes stercorosus © Entomart - CC BY-SA 3.0 | Bombus sylvarum © Axel Dehalleux - CC BY-SA 3.0 | Cicada orni © Fritz Geller-Grimm - CC BY-SA 3.0 | Cicadella viridis © Entomart - CC BY-SA 3.0 | Coccinella septempunctata © Dominik Stodulski - CC BY-SA 3.0 | Gryllotalpa brachyptera © Jacqueline McNally - CC BY-SA 3.0 | Ehipigiger diurnus © Gilles San Martin - CC BY-SA 3.0 | Lasius flavus © Bernard Boher - CC BY-SA 3.0 | Aritranis longicauda © H. Dumas - CC BY-SA 3.0 | Mantispia styriaca © Fabjc - CC BY-SA 3.0 | Hypochrysa elegans © Gilles San Martin - CC BY-SA 3.0 | Monopis obviella © Olaf Leillinger - CC BY-SA 3.0 | Nemophora degeerella © Magalie Mazuy - CC BY-SA 3.0 | Plutella xylostella © Olaf Leillinger - CC BY-SA 3.0 | Yponomeuta evonymella © Entomart - CC BY-SA 3.0 | Notonecta triguttata © Keisotyo - CC BY-SA 3.0 | Hagenella clathrata © Rob Felix - CC BY-SA 3.0 | Temnostoma vespiforme © Martin Andersson - CC BY-SA 3.0

#### Espèces

Lucanus cervus © Didier Descouens - CC BY-SA 3.0 | Euplagia quadripunctaria © Stephan Mense - CC BY-SA 3.0 | Phlogophora meticulosa © Holger Gröschl - CC BY-SA 3.0 | Pterostoma palpina © OPIE - CC BY-SA 3.0 | Saturnia pyri © OPIE - CC BY-SA 3.0 | Thyatira batis © Entomart - CC BY-SA 3.0 | Zeuzera pyrina © OPIE - CC BY-SA 3.0 | Biston betularia © OPIE - CC BY-SA 3.0 | Opisthographis luteolata © OPIE - CC BY-SA 3.0 | Gryllus campestris © Gilles San Martin - CC BY-SA 3.0 | Vespa crabro © Yves Fontanive - CC BY-SA 3.0 | Lampyrus noctiluca\_female © Wofl - CC BY-SA 3.0 | Lampyrus noctiluca\_male © Hectonichus - CC BY-SA 3.0 | Ruspolia nitidula © Gilles San Martin - CC BY-SA 3.0 | Tettigonia viridissima © Armin Kübelbeck - CC BY-SA 3.0 | Oryctes nasicornis\_female © Magne Flåten - CC BY-SA 3.0 | Oryctes nasicornis\_male © George Chernilevsky - CC BY-SA 3.0 | Deilephila elpenor © OPIE - CC BY-SA 3.0 | Laothoe populi © OPIE - CC BY-SA 3.0 | Mimas tiliae © OPIE - CC BY-SA 3.0

Silhouettes : © Aline Donini



### VOUS DÉBUTEZ EN ASTRONOMIE ?

Voici quelques outils qui vous aideront à bien débuter et à faire de votre première vraie observation du ciel étoilé un souvenir gravé dans votre mémoire !

#### Découvrez les podcasts en écoute libre sur Ciel & Espace Radio

##### « Observer le ciel à l'œil nu »

Premier outil d'observation, premier contact avec la voûte céleste, observer à l'œil nu reste le premier réflexe de l'Homme depuis l'Antiquité pour tenter de comprendre le soleil, la lune et les milliers d'étoiles.

Mais que voit-on réellement à l'œil nu compte tenu de la quantité d'objets visible dès la tombée du jour ?

Quelles sont les limites ?

Quel en reste aujourd'hui l'intérêt et le plaisir ?

avec Emmanuel Beaudoin astronome amateur

À écouter en particulier à partir de la septième minute pour des conseils pratiques d'observation !

> [bit.ly/1kiy8UE](https://bit.ly/1kiy8UE)

##### « Le ciel, comment débuter en astronomie »

Découvrir le ciel est affaire de patience !

Trouver le site idéal, s'équiper en cartes et vêtements chauds puis s'exercer à la vision de nuit : voilà des étapes indispensables pour naviguer dans les constellations.

Une initiation indispensable pour devenir un familier des stars de la voûte céleste.

avec Olivier Las Vergnas Président de l'A.F.A avec Yves Delaye La Maison de l'Astronomie avec Jean-Luc Dauvergne journaliste à Ciel et Espace

> [bit.ly/1mTY1dz](https://bit.ly/1mTY1dz)

#### Applications pour smartphone

Des applications sur smartphone peuvent vous aider à repérer les constellations. On peut notamment citer :

> Sky Map (Gratuit) Compatible Androïde (pas trouvé sur iOS)

> Stellarium Mobile Planétarium (1,98 €) - Compatible Androïde (pas trouvé sur iOS)

#### Vous pouvez également si vous le souhaitez vous procurer des magazines spécialisés

Hors série de Ciel & Espace n°21 « Débuter en astronomie »

Hors série de Ciel & Espace n°16 « Les constellations »


> Lien vers les numéros papiers : [bit.ly/1fVvFeP](https://bit.ly/1fVvFeP)

> Lien vers les numéros numériques : [bit.ly/1mTs8PC](https://bit.ly/1mTs8PC)



## 5. Fiche d'aide • Le cycle lunaire

*Pour être dans des conditions optimales, vous pouvez privilégier - mais ce n'est pas obligatoire - la période d'observation de 10 jours autour de la nouvelle lune (phase de la Lune ou celle-ci est entre la terre et le soleil, elle n'est donc pas visible dans le ciel). En effet, une phase proche de la pleine lune pourrait concurrencer l'attractivité de la lampe mise en place pour attirer les insectes.*



1. Nouvelle lune



2. Premier croissant



3. Premier quartier



4. Lune gibbeuse croissante



5. Pleine lune




6. Lune gibbeuse décroissante



7. Dernier quartier



8. Dernier croissant



1. Nouvelle lune



### DES CARACTÈRES DISTINCTIFS À SAVOIR REPÉRER CHEZ UN INSECTE

1. **Abdomen** : 3ème partie en bout du corps, à l'opposé de la tête, contenant les organes digestifs et reproducteurs
2. **Antennes** : paire d'appendices sensoriels (notamment olfactifs, tactiles, etc.) située sur la tête entre les yeux,
3. **Cerques** : appendices souvent présents par paires, à l'extrémité de l'abdomen, répondant à diverses fonctions (défense, préhension, reproduction, etc.) selon les espèces
4. **Elytres** : paire d'ailes antérieures durcies protégeant les ailes postérieures et l'abdomen en partie ou totalement
5. **Fémurs** : 3ème segments des pattes, sortes de « cuisses » chez les insectes
6. **Haltères** : également appelés les balanciers, ce sont la 2ème paire d'ailes modifiées des diptères servant généralement comme gouvernails pour le vol chez les diptères
7. **Mandibules** : mâchoires des insectes pouvant servir à la découpe et au broyage des aliments selon leur type (forme)
8. **Oviscapte** : long tube en bout de l'abdomen présent chez les femelles de certains insectes, utilisé pour la ponte et l'enfouissement des œufs
9. **Pétiole** : première partie de l'abdomen reliée au thorax, en forme de « petite boule », caractéristique des fourmis
10. **Rostre** : ensemble des pièces buccales proéminent et rigide chez certains insectes
11. **Scutellum** : petit triangle à la base des élytres assurant la jonction entre les ailes
12. **Thorax** : 2ème partie du corps situé entre la tête et l'abdomen et à laquelle sont liées les ailes et les pattes



## 7. Fiche d'aide • Schéma insecte




Schéma légendé de la morphologie d'un insecte type



# Insectes & Ciel étoilé

On pourrait penser que la nature dort la nuit, mais c'est tout le contraire ! Saviez-vous par exemple qu'il existe en France près de 20 fois plus d'espèces de papillons de nuit que de papillons de jour ? A l'instar de leurs homologues diurnes, elles jouent également un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes en participant notamment à la pollinisation. Or, des études montrent qu'un certain nombre d'organismes est impacté par la pollution lumineuse (oiseaux, chauves-souries, reptiles...). Qu'en est-il des insectes nocturnes et comment évaluer cet impact ? C'est à cette question que vous propose de répondre l'enquête participative « Insectes et Ciel étoilé », un projet initié par Noé Conservation, le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Association Française d'Astronomie. C'est le premier programme de sciences participatives doté d'un protocole double alliant astronomie et biodiversité.

Entrez dans le monde fascinant de la nuit !

Insectes et Ciel Étoilé est une enquête participative co-fondée par Noé Conservation, le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Association Française d'Astronomie. Elle fait partie du programme de sciences participatives du Muséum, Vigie-Nature.



Muséum  
national  
d'Histoire  
naturelle



VIGIE NATURE  
Un réseau de citoyens  
qui fait avancer la science